

ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ И АСПИРАНТОВ LECTURES FOR STUDENTS, INTERNS AND POSTGRADUATES

<https://doi.org/10.57256/2949-0715-2025-4-1-58-74>

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПИННОГО МОЗГА И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С НЕКОТОРЫМИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ (ЛЕКЦИЯ 1) (ИЗ ЦИКЛА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА»)

Буланкина И.А.¹, Губина М.И.¹, Гуцол Л.О.¹, Сусликова М.И.¹, Синельникова А.Н.¹,
Хакимова И.И.², Андреева В.Б.¹

¹ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)

² ООО «Профиль Медицинский центр» (664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 168, Россия)

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Спинальный мозг – важная часть центральной нервной системы, его функции тесно связаны с поддержанием работы органов, обеспечением взаимодействия между системами организма. Спинальный мозг играет основную роль в передаче информации между органами-эффекторами и головным мозгом, являясь проводником импульсов. Знание морфологической организации спинного мозга необходимо для студентов медицинских вузов, врачей-неврологов, нейробиологов, так как выполняемые спинным мозгом функции тесно связаны с сохранностью его анатомических структур. Поражение спинного мозга за счёт факторов инфекционной и неинфекционной природы является причиной развития многих патологических состояний и заболеваний центральной нервной системы. Во всём мире более 15 миллионов человек имеют поражения спинного мозга, что влечёт не только медицинские, но и значительные общественно-экономические последствия. Также чёткое представление о морфологических особенностях спинного мозга позволит предотвратить его повреждение при ряде манипуляций.

Цель работы. Рассмотреть особенности морфологической организации спинного мозга и взаимосвязь изменений анатомических структур с некоторыми патологическими состояниями и заболеваниями.

Результаты. В лекции приведены классические и современные представления о морфологической организации спинного мозга. Показано влияние изменений и повреждений различных структур спинного мозга на развитие патологических состояний и их проявления. В свою очередь наличие тех или иных симптомов позволяет предположить и диагностировать уровень поражения спинного мозга.

Заключение. Морфологическую организацию спинного мозга и её особенности необходимо учитывать при диагностике, лечении и прогнозе некоторых неврологических заболеваний. Поражение структур спинного мозга приводит к серьёзным последствиям, таким как нарушение чувствительности, движений и других функций органов.

Ключевые слова: центральная нервная система, спинной мозг, морфология, поражение спинного мозга

Для цитирования: Буланкина И.А., Губина М.И., Гуцол Л.О., Сусликова М.И., Синельникова А.Н., Хакимова И.И., Андреева В.Б. Морфологическая организация спинного мозга и её взаимосвязь с некоторыми патологическими состояниями (лекция 1) (Из цикла «Центральная нервная система»). Байкальский медицинский журнал. 2025; 4(1): 58-74. doi: 10.57256/2949-0715-2025-4-1-58-74

MORPHOLOGICAL ORGANIZATION OF THE SPINAL CORD AND ITS RELATIONSHIP WITH SOME PATHOLOGICAL CONDITIONS (LECTURE 1) (FROM THE “CENTRAL NERVOUS SYSTEM” LECTURE COURSE)

Irina A. Bulankina ¹, Marina I. Gubina ¹, Lyudmila O. Gutsol ¹, Mariia I. Suslikova ¹,
Anna N. Sinelnikova ¹, Inna I. Khakimova ², Viktoria B. Andreeva ¹

¹ Irkutsk State Medical University (664003, Irkutsk, Krasnogo Vosstaniya str., 1, Russian Federation)

² Medical Center “Profile” (664004, Irkutsk, Baikalskaya str., 168, Russian Federation)

ABSTRACT

Background. The spinal cord is an important part of the central nervous system, and its functions are closely related to maintaining the functioning of organs and ensuring interaction between body's organ systems. The spinal cord plays a major role in the transmission of information between effector organs and the brain, being a conductor of impulses. Knowledge of the morphological organization of the spinal cord is necessary for students at medical universities, neurologists, and neuroscientists, since the functions performed by the spinal cord are closely related to the preservation of its anatomical structures. Spinal cord damage due to infectious and non-infectious factors is the cause of the development of many pathological conditions and diseases of the central nervous system. More than 15 million people have spinal cord injuries worldwide which entails not only medical, but also significant socio-economic consequences. Also, a clear understanding of the morphological features of the spinal cord will prevent its damage during various manipulations.

The aim. To study the features of the morphological organization of the spinal cord, relationship of changes in anatomical structures with some pathological conditions and diseases.

Results. The lecture examines classical and modern ideas about the morphological organization of the spinal cord. The influence of changes and damages of various structures of the spinal cord on the development of pathological conditions and their manifestations is explored. In turn, the presence of certain symptoms suggests and diagnoses the level of spinal cord damage.

Conclusion. The morphological organization of the spinal cord and its features must be taken into account in the diagnosis, treatment and prognosis of certain neurological diseases. Damage to the structures of the spinal cord leads to serious consequences, such as impaired sensitivity, movement, and other organ functions.

Key words: *central nervous system, spinal cord, morphology, spinal cord injury*

For citation: Bulankina I.A., Gubina M.I., Gutsol L.O., Suslikova M.I., Sinelnikova A.N., Khakimova I.I., Andreeva V.B. Morphological organization of the spinal cord and its relationship with some pathological conditions (Lecture 1) (From the “Central Nervous System” lecture course). *Baikal Medical Journal*. 2025; 4(1): 58-74. doi: 10.57256/2949-0715-2025-4-1-58-74

АКТУАЛЬНОСТЬ

Нервная система играет важнейшую роль в управлении деятельностью различных систем организма, координировании протекающих в нём процессов [1]. Она обеспечивает согласованную работу клеток, тканей, органов и их систем как единого целого. Деятельность нервной системы лежит в основе чувств, обучения, памяти, речи и мышления – психических процессов, с помощью которых человек не только познает окружающую среду, но и может активно её изменить [2].

Для нервной системы характерны точная направленность нервных импульсов, высокая скорость проведения информации, высокая приспособляемость к изменяющимся условиям внешней среды.

Таким образом, функциями нервной системы являются:

- 1) установление взаимосвязей организма с внешней средой;
- 2) поддержание постоянства внутренней среды (гомеостаз);
- 3) управление функцией различных органов, систем и аппаратов, составляющих целостный организм;
- 4) координирование всех протекающих в организме процессов.

По топографическому принципу нервную систему делят на центральную и периферическую. К центральной нервной системе (ЦНС) относят головной и спинной мозг, к периферической – нервы, узлы, сплетения, периферические нервные окончания, которые распределяются по всему телу [3].

Спинной мозг – важная часть ЦНС, его функции тесно связаны с поддержанием работы органов, обеспечением взаимодействия между системами организма. Спинной мозг иннервирует кожу, опорно-двигательный аппарат и другие структуры. Он играет основную роль в передаче информации между ор-

ганами-эффекторами и головным мозгом, являясь проводником импульсов. По его восходящим проводящим путям сигналы, поступающие от кожи, мышц, сухожилий, кровеносных сосудов, органов грудной и брюшной полостей, устремляются вверх, к головному мозгу, а по нисходящим проводящим путям ответ из головного мозга идёт на периферию [1, 3].

Знание морфологической организации спинного мозга необходимо для студентов медицинских вузов, врачей-неврологов, нейробиологов, так как выполняемые спинным мозгом функции тесно связаны с сохранностью его анатомических структур. Поражение спинного мозга за счёт факторов инфекционной и неинфекционной природы является причиной развития многих патологических состояний и заболеваний центральной нервной системы [4–8].

При участии спинного мозга совершаются все наши движения, а его травмы сопровождаются различными расстройствами двигательных функций, около трети пострадавших погибают на догоспитальном этапе [6–9]. Во всём мире более 15 миллионов человек имеют поражения спинного мозга, что влечёт не только медицинские, но и значительные общественно-экономические последствия [9].

При поражении шейного утолщения возникает развитие тетраплегии в сочетании с нарушениями всех видов чувствительности по проводниковому типу ниже уровня патологического очага с тазовыми и трофическими расстройствами. Следствием поперечного поражения грудного отдела спинного мозга является нижняя параплегия с утратой ниже уровня локализации патологического очага всех видов чувствительности, нарушением тазовых функций и расстройством трофики тканей. При травме поясничного утолщения – нижняя параплегия с нарушением чувствительности и трофики тканей на ногах, тазовыми расстройствами [4, 7]. Примеры поражений спинного мозга приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

НЕКОТОРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (СОСТОЯНИЯ), ПРОТЕКАЮЩИЕ С ПОРАЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА

Заболевание/состояние	Характер поражения спинного мозга	Клинические проявления
Рассеянный склероз	Образование множественных рассеянных очагов демиелинизации	Спастические пара- или тетрапарез, тазовые нарушения, нарушения координации и глубокой чувствительности
Сирингомиелия	Образования в веществе спинного мозга нейроглиальных полостей, заполненных жидкостью	Нарушения чувствительности, нижний спастический парапарез, тазовые нарушения
Спинальные амиотрофии	Наследственная дегенерация двигательных нейронов передних рогов спинного мозга	Симметричная слабость, проксимальной мускулатуры, редко – дистальных мышц
Полиомиелит	Поражение двигательных нейронов передних рогов спинного мозга и ядер ствола полиовирусом	Периферический паралич ног с атрофией мышц
Спинная сухотка (сифилитическое поражение)	Воспалительная инфильтрация и дегенерация задних корешков в зоне их вхождения в спинной мозг	Нарушения глубокой чувствительности, стреляющие боли в ногах, вегетативная дисфункция
Туберкулёзный спондилит	Сдавление гранулёмой, натёчным абсцессом спинного мозга	Парапарез, тазовые нарушения

Чёткое представление о морфологических особенностях спинного мозга позволит предотвратить его повреждение при ряде манипуляций [10, 11], что встречается в клинической практике. Например, при проведении эпидуральной анестезии прямое повреждение нервных структур составляет около 0,006 % случаев [10].

ФИЛОГЕНЕЗ И ОНТОГЕНЕЗ СПИННОГО МОЗГА

В процессе филогенеза спинной мозг (туловищный мозг) появляется на III этапе развития нервной системы (трубчатая нервная система). В это время головного мозга ещё нет, поэтому в спинном мозге находятся центры для управления всеми процессами организма [3]. Спинной мозг имеет сегментарное строение, он состоит из связанных между собой невромеров, в пределах которых замыкается простейшая рефлекторная дуга. С появлением головного мозга (этап цефализации), в котором возникают высшие центры управления, спинной мозг попадает в подчинённое положение и становится проводником импульсов от периферии к головному мозгу и обратно, т. е. развиваются двусторонние связи с вышележащими отделами центральной нервной системы.

Таким образом, в процессе эволюции спинного мозга образуются два аппарата: один, более старый, сегментарный аппарат собственных связей спинного мозга и второй, более новый, надсегментарный аппарат двусторонних проводящих путей к головному мозгу [3].

Различный характер движений является определяющим фактором формирования особенностей строения спинного мозга. Поэтому при использовании конечностей, возникает два утолщения: шейное и поясничное. У человека в связи с более активной деятельностью руки, как органа труда, шейное утолщение более дифференцировано, то есть имеет более сложное строение [3].

Развитие центральной нервной системы проходит стадии пластинки, нервных валиков, желобка, нервной трубки и смыкания невропоров [12]. Спинной мозг развивается из нервной (мозговой) трубки, из её заднего отрезка, а из переднего возникает головной мозг [1, 3]. Из вентрального отдела мозговой трубки образуются передние столбы серого вещества и прилегающие к ним пучки нервных волокон. Из дорсального отдела возникают задние столбы серого вещества и задние канатики. Первоначально, на 3-м месяце внутриутробной жизни, спинной мозг занимает весь позвоночный канал, затем позвоночник начинает расти быстрее и мозг постепенно перемещается кверху (краниально). Благодаря такому «восхождению» спинного мозга, отходящие от него нервные корешки принимают косое направление и образуют «конский хвост». При рождении

конец спинного мозга находится на уровне III поясничного позвонка, а у взрослого достигает I–II поясничного позвонка [1, 3, 13, 14].

Пороки развития ЦНС составляют более 30 % всех пороков, которые выявляются у детей [15]. Нарушения развития спинного мозга чаще связаны с процессами смыкания нервных валиков в ранние периоды эмбриогенеза и обычно сочетаются с патологией осевого скелета. Спинальный дизрафизм (*spina bifida*) – термин, применяемый для обозначения группы расстройств, характеризующихся неполным слиянием или отсутствием слияния срединных структур позвонков и спинного мозга. *Spina bifida occulta*, которая относится к врождённым аномалиям позвоночника, а не спинного мозга, может быть случайной находкой при исследовании [16]. Однако дизрафии могут сопровождаться и клиническими проявлениями, такими как боль, тазовые нарушения, парезы и параличи, чувствительные и трофические расстройства. Врождённые спинномозговые грыжи (менингоцеле, менингоградикулоцеле, менингомиелоцеле и миелоцистоцеле) являются тяжёлыми пороками развития с грыжевым выпячиванием нервных тканей. Одной из наиболее тяжёлых форм дизрафий является рахизис – расщепление позвоночника и мягких тканей с расплыванием спинного мозга. Наблюдается полное незаращение дужек позвонков, отсутствие кожного покрова, мягких тканей, истечение ликвора.

К «негрыжевым» порокам развития спинного мозга относятся: амиелия (полное отсутствие спинного мозга или каких-либо его сегментов), арахия (незамыкание эмбриональной нервной трубки, в результате чего спинной мозг развивается в виде пластинки), сингомиелия (образование нейроглиальных полостей в сером веществе спинного мозга), микромиелия (малые размеры, недоразвитие спинного мозга) и др. [12].

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА

Спинной мозг (*medulla spinalis*), в длину составляет 41–42 см у женщин и 45 см у мужчин, его масса – 34–38 г, что составляет примерно 2 % от массы головного мозга [1, 13, 14]. Располагается в позвоночном канале от уровня большого затылочного отверстия (*foramen magnum*) или от места выхода I пары спинномозговых нервов до 1-го первого поясничного позвонка (L_I) – у мужчин, до 2-го поясничного позвонка (L_{II}) – у женщин; до 2–3-го поясничного позвонка (L_{II–III}) – у детей. Знание этого факта имеет практическое значение при поясничном проколе для взятия спинномозговой жидкости или для спинномозговой анестезии, так как иглу необходимо вводить ниже окончания спинного мозга, чтобы его не травмировать (у взрослых – между остистыми отростками 3-го и 4-го поясничных позвонков). Повреждение конуса спинного мозга при выполнении этих манипуляций,

согласно исследованиям [11], отмечались в тех случаях, когда пункция выполнялась на уровнях L_{I-III}. Эти данные подчёркивают важность учёта морфологических особенностей спинного мозга и соблюдения рекомендуемого уровня при пунктировании субарахноидального пространства (L_{III-IV}).

Длина спинного мозга взрослого человека примерно в три раза превышает его длину у новорождённого. В спинном мозге насчитывается более 13 миллионов нейронов [1, 3, 13, 14, 17]. Диаметр клеток не превышает 0,1 мм, а длина их отростков иногда достигает полутора метров. Скорость распространения нервного импульса по нервным волокнам может достигать до 120 м/с [2, 18, 19].

Вверху спинной мозг продолжается в продолговатый мозг, а внизу заканчивается мозговым конусом (*conus medullaris*), который от второго поясничного позвонка продолжается в терминальную нить (*filum terminale*) [13]. Терминальная (или концевая) нить спускается до 2-го копчикового позвонка (Co_{II}) и содержит в своём составе нервную ткань (только в верхних отделах), спинномозговые нервы, оболочки спинного мозга. Концевая нить вместе с корешками спинномозговых нервов, отходящих от 10 нижних сегментов, образуют конский хвост (*cauda equina*) [1, 3, 13, 14, 17, 20].

Спинной мозг на всём протяжении имеет два утолщения:

1) шейное (*intumescentia cervicalis*) – располагается с 5-го шейного сегмента по 1-й грудной сегменты (C_V–Th_I), обеспечивает иннервацию верхних конечностей, оно более сложно устроено;

2) пояснично-крестцовое (*intumescentia lumbosacralis*) – располагается с 12-го грудного по 3-й крестцовый сегменты (Th_{XII}–S_{III}) и обеспечивает иннервацию нижних конечностей.

На спинном мозге выделяют переднюю срединную щель (*fissure mediana anterior*) и заднюю срединную борозду (*sulcus medianus posterior*), за счёт которых он делится на две симметричные половины (рис. 1).

Каждая из них в свою очередь имеет по две борозды:

1) переднюю латеральную борозду (место выхода передних (двигательных) корешков спинномозговых нервов);

2) заднюю латеральную борозду (место входа задних (чувствительных) корешков спинномозговых нервов).

Эти борозды делят каждую половину белого вещества спинного мозга на три продольных канатика: передний, боковой и задний (*funiculus anterior, lateralis, posterior*). В канатиках залегает белое вещество.




Рис. 1.

Внешнее строение спинного мозга [13]

Задний канатик в шейном и верхнегрудном отделах делится ещё промежуточной бороздой на два пучка: тонкий (*fasciculus gracilis*) и клиновидный (*fasciculus cuneatus*).

С двух сторон из спинного мозга выходят передний и задний корешки спинномозговых нервов. На задних корешках имеется чувствительный узел спинномозгового нерва (*ganglion spinale*), состоящий из псевдоуниполярных нервных клеток [1, 3, 13].

Задние (дорзальные) корешки состоят из чувствительных (афферентных) волокон. Это [2]:

1) чувствительные волокна, идущие от рецепторов мышц, сухожилий, надкостницы и суставных сумок (проприоцептивная чувствительность);

2) чувствительные волокна, идущие от экстерорецепторов кожи: болевых, температурных, тактильных и рецепторов давления (кожная рецептирующая система);

3) афферентные волокна, идущих от рецепторов внутренних органов (висцероцептивная чувствительность).

Эфферентные выходы из передних рогов спинного мозга несут двигательные сигналы практически ко всем скелетным мышцам человека [2, 18, 19, 21, 22].

Передний и задний корешок соединяются и образуют ствол спинномозгового нерва (*truncus nervus spinalis*). Ствол нерва проходит через спинномозговое отверстие и распадается на ветви.

Задние корешки являются афферентными (чувствительными (сенсорными)), центростремительными, а передние – эфферентными (двигательными, либо секреторными), центробежными. Распределение функций между корешками спинного мозга в морфологии и физиологии носит название закона Белла – Мажанди [18]. Каждый корешок представляет собой множество нервных волокон. Например, вентральный корешок кошки включает около 6 тыс., а дорзальный – около 12 тыс. нервных волокон [23]. В настоящее время закон Белла – Мажанди оспаривается [2, 22], потому что могут быть функционально разные волокна в составе передних и задних спинномозговых корешков, хотя в задних корешках проходят преимущественно чувствительные, а в передних – двигательные волокна.

Перерезка задних корешков приводит к потере всех видов чувствительности в зоне соответствующих дерматомов. Возможны нарушения движений в мышцах соответствующих миотомов за счёт утраты афферентации, так как импульсы от проприорецепторов мышц не поступают в ЦНС. При поражении передних корешков спинного мозга возникают периферические параличи мышц [18].

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА

Спинной мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество (*substantia grisea*) занимает центральную часть и имеет форму бабочки с рас-

правленными крыльями или буквы Н. Оно простирается по всей длине спинного мозга вокруг центрального канала. Центральный канал вверх сообщается с IV желудочком головного мозга, а в области мозгового конуса заканчивается расширением, то есть конечным (терминальным) желудочком. Серое вещество в каждой половине спинного мозга образует передний (вентральный) и задний (дорсальный) столбы или рога. Передний рог (*cornu anterius*) более массивный, задний (*cornu posterius*) – более тонкий. Правая и левая половины серого вещества спинного мозга соединяются между собой серой спайкой (*commissura grisea*). В центре серой спайки залегает центральный канал [1] (рис. 2).




Рис. 2.

Внутреннее строение спинного мозга [13]: 1 – задний рог, 2 – боковой рог, 3 – передний рог, 4 – центральный канал спинного мозга, 5 – вторичное висцеральное вещество спинного мозга, 6 – задняя срединная борозда, 7 – задне-латеральная борозда, 8 – передняя срединная щель, 9 – задний канатик, 10 – боковой канатик, 11 – передний канатик

На некоторых сегментах спинного мозга, а именно от 8-го шейного и до 2-го поясничного (C_{VIII}–L_{II}) серое вещество образует, кроме переднего и заднего столбов, ещё и боковой столб, или рог (*cornu laterale*), располагающийся на уровне серой спайки. Нейроны серого вещества группируются в ядра.

Задний рог содержит чувствительные нейроны (точнее, вставочные (переключающие, ассоциативные) нейроны различных видов чувствительности, так как «истинные» чувствительные нейроны находятся в спинальных ганглиях) (рис. 3):

- 1) студенистое вещество (*substantia gelatinosa*);
- 2) собственное ядро (*nucleus proprius*);
- 3) грудное ядро (*nucleus thoracicus*).

Боковой рог содержит вегетативные симпатические ядра:

- 1) медиальное промежуточное ядро (*nucleus intermedius medialis*);
- 2) латеральное промежуточное ядро (*nucleus intermedius lateralis*).

Передний рог содержит пять двигательных ядер:

- 1) заднелатеральное ядро (*nucleus posterolateralis*),
- 2) переднелатеральное ядро (*nucleus anterolateralis*),
- 3) заднемедиальное ядро (*nucleus posteromedialis*),
- 4) переднемедиальное ядро (*nucleus anteromedialis*),
- 5) центральное ядро (*nucleus centralis*).

В спинном мозге находится около 13–14 миллионов нейронов [2, 18], из которых функционально только 3 % являются мотонейронами, а остальные – интернейронами (вставочными нейронами):

1. Мотонейроны (α и γ):

а) α -мотонейроны иннервируют экстрафузальные мышечные волокна, на дендритах которых множество синапсов (15–20 тыс.) и которые обеспечивают мышечное сокращение [19]. Несмотря на то, что α -мотонейроны обладают низкой частотой импульсации (около 20 в секунду), каждый α -мотонейрон может участвовать во многих рефлексных и произвольных движениях [2, 19]. Решение о том, произойдёт ли сокращение конкретных мышечных волокон в результате синаптического входа от того или иного источника формируется именно на его уровне (у млекопитающих). Мотонейрон называют «общим конечным путём» двигательной системы, так как именно он ассоциирует влияния различных вышележащих отделов ЦНС [21];

б) γ -мотонейроны иннервируют интрафузальные мышечные волокна. Во время сокращения экстрафузальных волокон именно их работа за счёт высокой частоты импульсации (150–200 импульсов в секунду) позволяет поддерживать мышечный тонус, предотвращая расслабление мышечных веретён (рис. 4).

2. *Интернейроны* находятся в задних рогах и средней части спинного мозга, организуют связи между различными структурами спинного мозга, а также между спинным мозгом и нейронами, расположенными в чувствительных ганглиях. Они способны возбуждаться с частотой около 1000 Гц [19]. Вставочные нейроны делятся на возбуждающие и тормозные (клетки Реншоу). Интернейроны обеспечивают влияние восходящих и нисходящих путей на клетки отдельных сегментов спинного мозга. Их возбуждение оказывает тормозящее влияние на мышцы-антагонисты.

3. *Нейроны симпатической и парасимпатической нервной системы.* Нейроны симпатической нервной системы располагаются в боковых рогах последнего шейного и тораколюмбальных сегментов (C_{VIII} – L_{II}) спинного мозга, для них характерна постоянная тоническая импульсная активность, низкая частота. Нейроны парасимпатической нервной системы локализованы в сакральном отделе спинного мозга, для них также характерна фоновая импульсная активность, частота которой возрастает по мере повышения давления в мочевом пузыре [21].

Белое вещество (*substantia alba*) состоит из отростков нервных клеток и составляет проводниковый аппарат спинного мозга. Оно осуществляет связь всех отделов спинного мозга на всём его протяжении и связь с вышележащими отделами головного мозга.

Белое вещество составляет три системы нервных волокон [1]:

1) короткие пучки ассоциативных волокон, соединяющие участки спинного мозга на различных уровнях (афферентные и вставочные нейроны), относятся к собственному аппарату спинного мозга;




Рис. 3.

Серое и белое вещество спинного мозга [13]




Рис. 4.
Эфферентная γ -моторная система спинного мозга [18]

2) длинные чувствительные (афферентные) волокна, составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с головным мозгом;

3) длинные двигательные (эфферентные) волокна, также входят в проводящую систему двусторонних связей с головным мозгом.

Собственный аппарат включает серое вещество спинного мозга с задними и передними корешками и собственными пучками белого вещества, окружающими серое вещество в виде узкой полосы. По развитию собственный аппарат является филогенетически более старым, чем головной мозг и потому сохраняет сегментарность строения, его функция – осуществление врождённых реакций.

Таким образом, нервный сегмент – это поперечный срез спинного мозга, с двумя отходящими от него спинномозговыми нервами, развившимися из одного невротомы [3] (рис. 5).




Рис. 5.
Сегмент спинного мозга [37]

Каждый сегмент через свои корешки иннервирует три метамера тела, т. е. определённую группу скелетных мышц и участок кожи (рис. 6). От каждо-

го спинномозгового сегмента отходят две пары вентральных и дорзальных корешков.




Рис. 6.
Соотношение сегментов спинного мозга с метамерами
тела [18]

Различают следующие отделы спинного мозга: шейный, состоящий из 8 сегментов, грудной – 12 сегментов, поясничный – 5 сегментов, крестцовый – 5 сегментов, и копчиковый – 1 сегмент (рис. 7).




Рис. 7.
Сегменты спинного мозга [18]

Белое вещество залегает на периферии спинного мозга и делится на канатики [1, 3]:

- 1) передний – содержит, в основном, нисходящие двигательные пути;
- 2) боковой – содержит восходящие и нисходящие пути;
- 3) задний – содержит восходящие чувствительные пути.

Передний канатик включает в себя следующие пути:

- 1) от коры головного мозга: передний корково-спинномозговой (пирамидный) путь, вместе с латеральным корково-спинномозговым путём составляет общую пирамидальную систему и обеспечивает сознательные произвольные движения (рис. 3, 8);

- 2) от среднего мозга:

– передний покрывочно-спинномозговой путь (благодаря ему осуществляются рефлекторные защитные реакции на неожиданные световые, слуховые, обонятельные и тактильные раздражения (защитные рефлексы));

– медиальный продольный пучок, который обеспечивает сочетанный поворот головы и глаз, поэтому при поражении медиального продольного пучка невозможен данный вид движения [3];

- 3) к промежуточному мозгу идёт передний спинно-таламический путь – проводит импульсы осязания, прикосновения (т. е. тактильной чувствитель-




Рис. 8.
Восходящие и нисходящие проводящие пути [13]

ности). Ряд пучков идёт к передним рогам спинного мозга от ядер заднего мозга, имеющих отношение к координации и поддержанию равновесия;

4) передний преддверно-спинномозговой путь – обеспечивает перераспределение тонуса мышц в ответ на изменение тела в пространстве (при вестибулярных нагрузках);

5) передний ретикулярно-спинномозговой и спиноретикулярный пути – обеспечивают поддержание тонуса мускулатуры и дифференцировку импульсов, проходящих по другим трактам;

6) передние собственные пучки – обеспечивают передачу нервных импульсов к нейронам выше- и нижележащих сегментов [3].

Боковой канатик содержит следующие пути:

1. Восходящие:

- к заднему мозгу: передний спинно-мозжечковый путь Говерса, задний спинно-мозжечковый путь Флексига. Оба пути проводят бессознательные проприоцептивные импульсы (бессознательная координация движений) [3];

- к среднему мозгу: спинно-покрышечный путь – проводит импульсы общей чувствительности от туловища, конечностей и шеи [3];

- к промежуточному мозгу: латеральный спинно-таламический путь – проводит температурные и болевые импульсы до таламуса, при поражении этого пути на стороне противоположной патологическому очагу, с уровня на 2–3 дерматома ниже очага поражения возникает нарушение болевой и температурной чувствительности по проводниковому типу [24].

2. Нисходящие:

- от коры головного мозга: латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь, имеющий перекрёст на уровне продолговатого мозга, обеспечивает сознательные (произвольные) движения на противоположной стороне и тормозящее воздействие на сегментарный аппарат. Выполнение произвольных движений связано с выработкой плана и программы действия в двигательном анализаторе коры. Далее сигнал должен пройти до группы мышечных исполнительцев. При одностороннем поражении корково-спинномозгового пути в головном мозге выше его перекрёста, расстройства произвольных движений возникают в мышцах конечностей на противоположной стороне. В то время как нарушение проводимости ниже перекрёста приводит к расстройствам произвольных движений на стороне поражения [7];

- от среднего мозга: красномышечный-спинномозговой путь – обеспечивает поддержание тонуса скелетных мышц (позы) и участвует в выполнении сложных автоматизированных движений (бег, ходьба);

- от заднего мозга: оливо-спинномозговой путь – обеспечивает перераспределение тонуса мышц в ответ на изменение положение тела в пространстве (при вестибулярных нагрузках);

- латеральные собственные пучки – образованы аксонами вставочных нейронов сегментарного аппарата.

Задний канатик содержит волокна задних корешков спинномозговых нервов, которые образуют:

1) задние собственные пучки – состоят из аксонов вставочных нейронов сегментарного аппарата,




Рис. 9.

Проводящие пути болевой, температурной и тактильной чувствительности (а), суставно-мышечного чувства (б): КП – клиновидный пучок; ТП – тонкий пучок; ЯТП – ядро тонкого пучка; ЯКП – ядро клиновидного пучка; ЛСТП – латеральный спиналоталамический путь; ПСТП – передний спиналоталамический путь [6]

соединяющих сегменты различных уровней спинного мозга между собой;

2) тонкий (нежный) пучок Голля – проводит импульсы от нижних конечностей и нижней части туловища (от 19 нижних сегментов спинного мозга);

3) клиновидный пучок Бурдаха – проводит импульсы от верхних конечностей и верхней части туловища (12 верхних сегментов спинного мозга).

Тонкий и клиновидный пучки проводят от соответствующих частей тела к коре головного мозга сознательную проприоцептивную (мышечно-суставное чувство) и кожную (чувство стереогноза – узнавание предмета на ощупь) чувствительность, имеющую отношение к определению положения тела в пространстве. Также совместно со спинноталамическим путём тонкий и клиновидный пучок принимают участие в проведении тактильной чувствительности (чувство осязания, прикосновения, давления, вибрации, массы тела) (рис. 9). При поражении заднего канатика нарушается мышечно-суставное чувство, вибрационная и отчасти тактильная чувствительность на той же стороне тела больного, ниже уровня локализации патологического очага (нарушение чувствительности по заднестолбовому типу). Поражение задних канатиков спинного мозга обычно встречаются при спинной сухотке (*tabes dorsalis*) (табетический тип) [4, 6].

ОБОЛОЧКИ СПИННОГО МОЗГА

Спинной мозг покрыт тремя оболочками (*meninges*), происходящими из мезодермы вокруг мозговой трубки (рис. 10).

Краниально они продолжают в такие же оболочки головного мозга.

1. Твёрдая оболочка (*dura mater spinalis*) покрывает снаружи спинной мозг.

Между надкостницей позвоночного канала и твёрдой оболочкой находится эпидуральное пространство (*cavum epidurale*). В нём залегают жировая клетчатка и венозные сплетения (*plexus venosi vertebrates interni*), в которые оттекает венозная кровь от спинного мозга и позвонков (рис. 11).

Краниально твёрдая оболочка срастается с краями большого затылочного отверстия, а каудально заканчивается на уровне 2–3-го крестцовых позвонков и в виде нити (*filum durae matris spinalis*) прикрепляется к копчику.

2. Паутинная оболочка (*arachnoidea spinalis*), не содержит сосудов. Между твёрдой оболочкой и паутинной находится субдуральное пространство (*spatium subdurale*), заполненное соединительной тканью.

3. Сосудистая оболочка (*pia mater spinalis*) содержит сосуды, вместе с которыми заходит в борозды и вещество мозга.





Рис. 10.

Оболочки спинного мозга [13]

**Рис. 11.**

Оболочки и межоболочечные пространства спинного мозга [13]

Между паутинной оболочкой и сосудистой оболочкой выделяют подпаутинное пространство (*cavum subarachnoideale*), в котором большое количество спинномозговой жидкости (*liquor cerebrospinalis*). Это пространство увеличивается в нижней части, где оно образует терминальную цистерну спинного мозга (*cisterna terminalis*, пятый желудочек) [1, 3, 13].

Всего в подпаутинном пространстве находится от 60 до 200 см³, в среднем около 135 см³ спинномозговой жидкости [1, 3]. Спинномозговая жидкость – это чистая и прозрачная жидкость низкой плотности (около 1,005). Она содержит соли в таком же составе и примерно в таком же количестве, как плазма крови. Однако у здорового человека в спинномозговой жидкости белка в 10 раз меньше, чем в плазме крови [3].

Спинномозговая жидкость имеет механическое значение как жидкая среда, окружающая мозг и предохраняющая его от толчков и сотрясений; обеспечивая постоянство внутричерепного давления. Она участвует в процессах обмена веществ в тканях мозга, в неё выделяются продукты метаболизма нервной ткани. Спинномозговая жидкость поддерживает постоянство осмотического давления в тканях мозга, принимает участие в нейрогуморальной и эндокринной регуляции, участвует в работе гематоэнцефалического барьера.

Между паутинной и сосудистой оболочками в шейной области, сзади вдоль средней линии образуется перегородка (*septum cervicale intermedium*).

По бокам спинного мозга во фронтальной плоскости располагается зубчатая связка (*ligamentum denticulatum*), состоящая из 19–23 зубцов, проходящих в промежутках между передними и задними корешками. Зубчатые связки служат для укрепления мозга на месте, не позволяя ему вытягиваться в длину.

Кровоснабжение спинного мозга осуществляется из разных источников, в основном расположенных вне полости черепа и позвоночника. К нему подходят ветви от позвоночной артерии (система подключичной артерии), глубокой шейной артерии (из рёберно-шейного ствола), а также от задних межрёберных поясничных и латеральных крестцовых артерий, отдающих спинномозговые ветви [1, 3, 4, 13, 14]. К спинному мозгу прилежат три длинных продольных артериальных сосуда: передняя и две задние спинномозговые артерии. Передние и задние спинномозговые артерии (*aa. spinales anterior et posteriores*), спускаясь вдоль спинного мозга, соединяются между собой многочисленными ветвями, образуя на поверхности мозга сосудистую сеть (так называемую *vasocorona*). От этой сети отходят веточки, проникающие вместе с отростками сосудистой оболочки в вещество мозга. Вены аналогичны артериям и впадают в итоге во внутреннее венозное сплетение (*plexus venosi vertebrates interni*). Варикозное расширение внутренних позвоночных венозных сплетений может привести к сдавлению спинного мозга в позвоночном канале. Схема кровоснабжения спинного мозга представлена на рисунке 12.


**Рис. 12.**

Схема кровоснабжения спинного мозга [14]; **а** – артерии спинного мозга: 1 – задняя спинномозговая артерия; 2 – передняя спинномозговая артерия; 3 – корешковая артерия; 4 – водораздел; 5 – позвоночная артерия; 6 – восходящая шейная артерия; 7 – водораздел; 8 – дуга аорты; 9 – грудная межрёберная артерия; 10 – аорта; 11 – водораздел; 12 – артерия Адамкевича; 13 – поясничная артерия; **б** – вены спинного мозга: 14 – позвоночная вена; 15 – глубокая шейная вена; 16 – спинномозговая вена; 17 – корешковая вена; 18 – нижняя яремная вена; 19 – подключичная вена; 20 – правая брахиоцефальная вена; 21 – левая брахиоцефальная вена; 22 – добавочная полунепарная вена; 23 – непарная вена;

24 – полунепарная вена; **в** – поперечный распил позвоночника и срез спинного мозга; кровоснабжение: 25 – ветвь спинномозгового нерва; 26 – передний корешок; 27 – эпидуральное пространство; 28 – сосудистая корона; 29 – передние спинномозговые артерия и вена; 30 – задние спинномозговые артерии; 31 – задняя спинномозговая вена; 32 – передняя корешковая вена; 33 – заднее наружное позвоночное венозное сплетение; 34 – мягкая мозговая оболочка; 35 – спинномозговой нерв; 36 – спинномозговой ганглий

К лимфатическим сосудам спинного мозга можно отнести периваскулярные пространства вокруг сосудов, сообщающиеся с подпаутинным пространством. Нервы происходят от *rami meningei* спинномозговых нервов [1, 3, 13].

Встречаются различные виды патологии сосудов спинного мозга [4], которые прямо или косвенно нарушают его кровоснабжение (миелоишемия, гематомия). Нарушения кровообращения спинного мозга могут быть кратковременными и иметь обратимый характер, либо наблюдаются длительно, что приводит к тяжёлым последствиям и инвалидизации. Например, травма позвоночника может сопровождаться разрывом спинального сосуда. К развитию гематомии также могут привести разрыв аневризмы спинального сосуда, инфекционный васкулит, геморрагический диатез и т. д. Миелоишемия может проявляться периодической утомляемостью и мышечной слабостью в конечностях, чувством зябкости, снижением чувствительности вплоть до полного нарушения всех видов чувствительности, трофических изменений в тканях, образования пролежней, нарушения работы мышц, мочеиспускания и дефекации [4–7]. Основные синдромы (симптомы) при нарушении артериального кровоснабжения спинного мозга представлены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ (СИМПТОМЫ) ПРИ НАРУШЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА [4]

Бассейн артерии	Синдром	Симптомы	Примечание (*)
Передние спинномозговые артерии (бороздчатые артерии)	Синдром Броун – Секара*	На стороне поражения – паралич (или парез) центральный и утрата мышечно-суставной и вибрационной чувствительности; на противоположной стороне – выпадение болевой и температурной чувствительности	*Половинное поражение спинного мозга
Передняя и задние спинномозговые артерии*		1. Нижняя параплегия или тетраплегия (в зависимости от уровня поражения). 2. Параанестезия всех видов чувствительности. 3. Тазовые расстройства.	*Поперечное поражение спинного мозга
Передняя спинномозговая артерия – окклюзия*	Синдром Преображенского	1. Парез или паралич (на уровне выше шейного утолщения – тетрапарез спастический, на уровне грудных сегментов – парапарез спастический, ниже – парапарез периферический). 2. Нарушение болевой и температурной чувствительности по проводниковому типу. 3. Тазовые расстройства.	

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

Передняя спинно-мозговая артерия – тромбоз*	Переднероговой синдром (передняя полиомиелоишемия)	1. Нижний парапарез периферический. 2. Двустороннее нарушение чувствительности проводникового типа. 3. Тазовые расстройства периферические.	*Чаще – при поражении на уровне поясничного утолщения; *+ симптомы-предвестники; *У лиц > 18 лет.
Передняя спинно-мозговая артерия – тромбоз*		1. Нижний парапарез периферический или смешанный, или спастический. 2. Параанестезия диссоциированная. 3. Тазовые расстройства центральные.	*На шейном уровне
Передняя спинно-мозговая артерия – тромбоз*		1. Нижний парапарез периферический. 2. Параанестезия диссоциированная. 3. Тазовые расстройства центральные.	*На грудном уровне
Радикуло-медуллярные артерии на уровне Th _{IV–XII}	Синдром центромедуллярного инфаркта (сирингомиелический синдром)	1. Паралич периферический мышц туловища и конечностей. 2. Расстройства чувствительности (диссоциированная анестезия) сегментарного типа.	Ишемическое поражение спинного мозга центральной части его поперечника вокруг центрального канала
Большая передняя спинномозговая артерия – закупорка*		1. Параплегия нижняя или парапарез периферический. 2. Расстройства поверхностной чувствительности по проводниковому типу с уровня от Th _{II–III} до Th _{XII} . 3. Трофические нарушения. 4. Тазовые расстройства.	*Поражение на уровне нижегрудных и поясничных сегментов
Нижняя дополнительная передняя корешково-спинномозговая артерия (артерия Деппрожа – Готтерона) – окклюзия*		1. Паралич периферический нижних конечностей, более в дистальных отделах. 2. Гипестезия в аногенитальной зоне и на нижних конечностях. 3. Тазовые расстройства по периферическому типу.	*Имеется у 20 % людей *Кровоснабжение конского хвоста и каудального отдела спинного мозга
Передняя корешково-спинномозговая артерия	Синдром Станиловского – Танона	1. Нижняя параплегия периферическая с арефлексией. 2. Нарушение болевой и температурной чувствительности в зоне сегментов L _I –S _V . 3. Тазовые расстройства по периферическому типу. 4. Трофические нарушения в зоне иннервации L _I –S _V .	*Поражение передней части пояснично-крестцового утолщения
Задняя спинная артерия		1. Паралич спастический (реже периферический); 2. Нарушение чувствительности проприорецептивной (суставно-мышечное чувство) и вибрационной;	
Задняя спинальная артерия на уровне грудных сегментов – ишемия при тромбозе*	Синдром Уиллиамсона	1. Парапарез нижний центральный, атаксия сенситивная (заднестолбовая) с верхним уровнем в дерматомах, соответствующих уровню поражённого сегмента спинного мозга. 2. Двустороннее выпадение глубокой чувствительности по проводниковому типу. 3. Парагипестезия сегментарная. 4. Тазовые расстройства периферические.	
Задняя спинальная артерия на уровне сегментов C _I –C ₈	Синдром заднего канатика	Выпадение глубокой чувствительности в верхней конечности, верхнем отделе грудной клетки на стороне поражения	*Поражение клиновидного пучка (Бурдаха)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спинальный мозг – филогенетически самый древний отдел центральной нервной системы, сохраняющий сегментарное строение. Ему свойственно множество функций: участие в управлении нашими движениями, восприятием, обработка и передача информации от рецепторов, передача эфферентных влияний к органам-эффекторам. В спинном мозге располагаются нейроны разных типов: α - и γ -мотонейроны, чувствительные, вставочные нейроны, возбуждающие и тормозящие. На его структурах замыкается большое количество рефлекторных дуг разной степени сложности, принимающих участие в регуляции соматических и вегетативных функций организма. Белое вещество спинного мозга выполняет проводниковую функцию, проводя импульсы как в восходящем, так и в нисходящем направлении. Это позволяет нам воспринимать и реагировать на изменения, происходящие как внутри организма, так и в окружающем нас мире. Спинальный мозг имеет богатое кровоснабжение, обеспечивающее высокую активность метаболических процессов в его нервных клетках. Поражение структур спинного мозга приводит к серьёзным последствиям, таким как нарушение чувствительности, движений и других функций органов, и во многом определяет внешние проявления патологического состояния или заболевания. Такие повреждения могут происходить за счёт поломок на этапе онтогенеза, воздействия факторов инфекционной и неинфекционной природы, дефицита кровоснабжения. В свою очередь наличие тех или иных симптомов позволяет предположить и диагностировать уровень поражения спинного мозга и возможные морфологические субстраты этого поражения.

Таким образом, морфологическую организацию спинного мозга и её особенности необходимо учитывать при диагностике, прогнозе и лечении некоторых неврологических заболеваний.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., Ключкова С.В. *Анатомия человека: учебник*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. [Sapin M.R., Nikityuk D.B., Nikolenko V.N., Klochkova S.V. *Human anatomy: Textbook*. Moscow: GEOTAR-Media Publ., 2022. (In Russ.).]
2. Ноздрачев А.Д., Маслюков П.М. *Нормальная физиология: учебник*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. [Nozdrachev A.D., Maslyukov P.M. *Normal physiology: Textbook*. Moscow: GEOTAR-Media Publ., 2019. (In Russ.).]
3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. *Анатомия человека: учебник*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. [Prives M.G., Lysenkov N.K., Bushkovich V.I. *Human anatomy: Textbook*. Moscow: GEOTAR-Media Publ., 2023. (In Russ.).]
4. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А., Тиссен Т.П. *Спинальная ангионеврология: руководство*

для врачей. М.: МЕДпресс-информ, 2003. [Skoromets A.A., Skoromets A.P., Skoromets T.A., Thyssen T.P. *Spinal angioneurology: A guide for doctors*. Moscow: MEDpress-inform Publ., 2003. (In Russ.).]

5. Левин О.С., Штульман Д.Р. *Неврология: справочник практического врача*. М.: МЕДпресс-информ, 2019. [Levin O.S., Shtulman D.R. *Neurology: A practical doctor's handbook*. Moscow: MEDpress-inform, 2019. (In Russ.).]

6. Никифоров А.С., Гусев Е.И. *Общая неврология: учебное пособие*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. [Nikiforov A.S., Gusev E.I. *General neurology: A textbook*. Moscow: GEOTAR-Media Publ., 2007. (In Russ.).]

7. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. *Клиническая неврология*. М.: Медицина, 2004. [Nikiforov A.S., Konovalov A.N., Gusev E.I. *Clinical neurology*. Moscow: Medicine, 2004. (In Russ.).]

8. Булах А.А., Ковлягин Д.Е. Травматическая болезнь спинного мозга: этиология, клиника, диагностика, отдалённые последствия. *Вестник науки*. 2024; 6(75): 1969-1979. [Bulakh A.A., Kovlyagin D.E. Traumatic spinal cord disease: Etiology, clinic, diagnosis, long-term consequences. *Bulletin of Science*. 2024; 6(75): 1969-1979. (In Russ.).]

9. Морозов И.Н., Млявях С.Г. Эпидемиология позвоночно-спинномозговой травмы (обзор). *Медицинский альманах*. 2011; 4(17): 157-159. [Morozov I.N., Mlyavykh S.G. Epidemiology of spinal cord injury (review). *Meditinskiy al'manakh*. 2011; 4(17): 157-159. (In Russ.).]

10. Maddali P., Moisi M., Page J., Chamiraju P., Fissahn C., Oskouian R., et al. Anatomical complications of epidural anesthesia: A comprehensive review. *Clin Anat*. 2017; 30(3): 342-346. doi: 10.1002/ca.22831

11. Овечкин А.М., Политов М.Е., Морозов Д.В. Неврологические осложнения регионарной анестезии. *Регионарная анестезия и лечение острой боли*. 2018; 12(1): 6-14. [Ovechkin A.M., Politov M.E., Morozov D.V. Neurological complications of regional anesthesia. *Regional Anesthesia and Acute Pain Management*. 2018; 12(1): 6-14. (In Russ.).] doi: 10.188.21/1993-6508-2018-12-1-6-14

12. Бурлуцкая Д.В. Филонтогенетически обусловленные врождённые пороки развития спинного мозга. *Молодёжная наука – первый шаг в науку большую: сборник статей IV Международной научно-практической конференции*. Петрозаводск: Новая наука, 2023: 238-247. [Burlutskaya D.V. Philontogenetically caused congenital malformations of the spinal cord. *Youth Science – the First Step into Big Science: Proceedings of the IV international research and practical conference*. Petrozavodsk: Novaya nauka Publ., 2023: 238-247. (In Russ.).]

13. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. *Атлас анатомии человека: учебное пособие*. М.: Новая волна, 2023. [Sinelnikov R.D., Sinelnikov Ya.R., Sinelnikov A.Ya. *Atlas of human anatomy: Textbook manual*. Moscow: Novaya volna Publ., 2023. (In Russ.).]

14. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И. *Анатомия человека: учебник*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. [Gaivoronsky I.V., Nichiporuk G.I., Gaivoronsky A.I. *Human anatomy: Textbook*. Moscow: GEOTAR-Media Publ., 2024. (In Russ.).]

15. Залетина А.В., Виссарионов С.В., Баиндурашвили А.Г., Садовой М.А., Соловьёва К.С., Овечкина А.В., и др. Распространённость врождённых пороков развития позвоночника у детей в регионах Российской Федерации. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2018; (4): 63-66. [Zaletina A.V., Vissarionov S.V., Baidurashvili A.G., Sadovoy M.A., Soloveva K.S., Ovechkina A.V., et al. Prevalence of congenital malformations of the spine in children in the regions of the Russian Federation. *International Journal of Applied and Fundamental Research*. 2018; (4): 63-66. (In Russ.)].

16. Виссарионов С.В., Богатырёв Т.Б., Кокушин Д.Н. Сочетание скрытых форм спинальной дисграфии и врождённых пороков развития позвоночника с аномалиями внутренних органов и систем у детей. *Фундаментальные исследования*. 2015; 1(6): 1138-1142. [Vissarionov S.V., Bogatyrev T.B., Kokushin D.N. Combination of latent forms of spinal dysraphy and congenital malformations of the spine with abnormalities of internal organs and systems in children. *Fundamental Research*. 2015; 1(6): 1138-1142. (In Russ.)].

17. Колесников Л.Л. *Анатомия человека: атлас*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. [Kolesnikov L.L. *Human anatomy: Atlas*. Moscow: GEOTAR-Media Publ., 2022. (In Russ.)].

18. Алейникова Т.В., Думбай В.Н., Кураев Г.А., Фельдман Г.Л. *Физиология центральной нервной системы: учебное пособие*. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. [Aleynikova T.V., Dumbai V.N., Kuraev G.A., Feldman G.L. *Physiology of the central nervous system: A textbook*. Rostov-on-Don: Phoenix Publ., 2000. (In Russ.)].

19. Тель Л.З., Агаджанян Н.А., Хамчиев К.М., Циркин В.И., Лысенков С.П. *Нормальная физиология: учебник*. М.: Литтерра, 2021. [Tel L.Z., Aghajanyan N.A., Khamchiev K.M., Tsikin V.I., Lysenkov S.P. *Normal physiology: Textbook*. Moscow: Litterra Publ., 2021. (In Russ.)].

20. Каган И.И., Чемезов С.В. *Топографическая анатомия и оперативная хирургия*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. [Kagan I.I., Chemezov S.V. *Topographic anatomy and operative surgery*. Moscow: GEOTAR-Media Publ., 2022. (In Russ.)].

21. Камкин А.Г., Каменский А.А. (ред.). *Фундаментальная и клиническая физиология: учебник для студентов высших учебных заведений*. М.: Академия, 2004. [Kamkin A.G., Kamensky A.A. (eds). *Fundamental and clinical physiology: A textbook for students of higher educational institutions*. Moscow: Akademiya Publ., 2004. (In Russ.)].

22. Холл Дж.Э., Холл М.Э. *Медицинская физиология по Гайтону и Холлу*. М.: Логосфера, 2024. [Hall J.E., Hall M.E. *Medical physiology according to Gaïton and Hall*. Moscow: Logosphere Publ., 2024. (In Russ.)].

23. Смирнов В.М., Яковлев В.Н. *Физиология центральной нервной системы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений*. М.: Академия, 2004. [Smirnov V.M., Yakovlev V.N. *Physiology of the central nervous system: A textbook for students of higher educational institutions*. Moscow: Akademiya Publ., 2004. (In Russ.)].

24. Мументалер М., Бассетти К. *Дифференциальный диагноз в неврологии*. М.: МЕДпресс-информ, 2022. [Mumentaler M., Bassetti K. *Differential diagnosis in neurology*. Moscow: MEDpress-inform Publ., 2022. (In Russ.)].

Конфликт интересов

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования

Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.

Вклад авторов

Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.

Информация об авторах

Буланкина Ирина Анатольевна – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия). ORCID: 0000-0002-3531-7900

Губина Марина Иннокентьевна – к.б.н., доцент кафедры нормальной физиологии, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия). ORCID: 0009-0006-5767-6695

Гуцол Людмила Олеговна – к.б.н., доцент, доцент кафедры патологической физиологии и клинической лабораторной диагностики, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия). ORCID: 0000-0003-4217-0617

Conflict of interest

The authors declare no apparent or potential conflict of interest related to the publication of this article.

Funding source

The authors declare no external funding for the study and publication of the article.

Authors' contributions

The authors declare their authorship to be in compliance with the international ICMJE criteria. All authors equally participated in the preparation of the publication: developing the concept of the article, obtaining and analyzing factual data, writing and editing the text of the article, checking and approving the text of the article.

Information about the authors

Irina A. Bulankina – Cand. Sci. (Med), Docent, Head of the Department of Human Anatomy, Operative Surgery and Forensic Medicine, Irkutsk State Medical University (664003, Irkutsk, Krasnogo Vosstaniya str., 1, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-3531-7900

Marina I. Gubina – Cand. Sci. (Biol.), Associate Professor at the Department of Normal Physiology, Irkutsk State Medical University (664003, Irkutsk, Krasnogo Vosstaniya str., 1, Russian Federation). ORCID: 0009-0006-5767-6695

Lyudmila O. Gutsol – Cand. Sci. (Biol.), Docent, Associate Professor at the Department of Pathological Physiology and Clinical Laboratory Diagnostics, Irkutsk State Medical University (664003, Irkutsk, Krasnogo Vosstaniya str., 1, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-4217-0617

Сусликова Мария Игоревна – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой нормальной физиологии, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия). ORCID: 0009-0003-9278-0015

Синельникова Анна Николаевна – ассистент кафедры анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия).

Хакимова Инна Игоревна – врач-невролог высшей квалификационной категории, ООО «Профиль Медицинский центр» (664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 168, Россия). ORCID: 0009-0002-1057-7252

Андреева Виктория Борисовна – преподаватель кафедры общепрофессиональных дисциплин Института сестринского образования, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия). ORCID: 0009-0003-2811-1204

Для переписки

Гуцол Людмила Олеговна, gutzol@list.ru

Mariia I. Suslikova – Cand. Sci. (Med), Docent, Head of the Department of Normal Physiology, Irkutsk State Medical University (664003, Irkutsk, Krasnogo Vosstaniya str., 1, Russian Federation). ORCID: 0009-0003-9278-0015

Anna N. Sinelnikova – Teaching Assistant at the Department of Human Anatomy, Operative Surgery and Forensic Medicine, Irkutsk State Medical University (664003, Irkutsk, Krasnogo Vosstaniya str., 1, Russian Federation).

Inna I. Khakimova – Neurologist, Medical Center Profile (664004, Irkutsk, Baikalskaya str., 168, Russian Federation). ORCID: 0009-0002-1057-7252

Viktoriya B. Andreeva – Lecturer at the Department of General Professional Disciplines of the Institute of Nursing Education, Irkutsk State Medical University (664003, Irkutsk, Krasnogo Vosstaniya str., 1, Russian Federation). ORCID: 0009-0003-2811-1204

Corresponding author

Lyudmila O. Gutzol, gutzol@list.ru

Получена 04.02.2025
Принята 09.02.2025
Опубликована 10.03.2025

Received 04.02.2025
Accepted 09.02.2025
Published 10.03.2025